2015.1作成

TS－1®＋カルボプラチン療法を受けられる方へ

投与スケジュール



3週間を1コースとして繰り返します。

主な副作用と発現時期

次のような症状があらわれたら、医療スタッフにお知らせください。
※　個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

治療当日～数日	●血管痛・静脈炎　●吐き気・嘔吐　●食欲不振 ●疲労　●手足のしびれ
治療数日～数週間	●口内炎　●下痢　●便秘　●皮疹 ●白血球減少　●貧血　●血小板減少
数週間～数ヶ月	●色素沈着　●涙目

◇ 吐き気・嘔吐、食欲不振

なるべく水分をとるようにし、冷ましたものやにおいのあまりしないものを、食べられるときに少しずつ食べましょう。

◇下痢

腸の粘膜傷害により、下痢が起こりやすくなります。スポーツ飲料などで水分補給し、おなかを温かくして安静にしてください。
治療開始後、数日以内に下痢と口内炎が同時に起こったときはティーエスワンの服用を中止してすぐに病院に連絡してください。

◇ 口内炎

頬の内側の粘膜や歯ぐきに口内炎ができることがあります。口の中の痛みにより食事がとれないこともあります。うがいをこまめに行い、普段から口の中を清潔にしておきましょう。

◇ 皮疹

手や足、顔、背中などに赤みを帯びて腫れてくることがあります。
皮疹が現れた場合はティーエスワンの服用を一旦やめて、すぐに病院に連絡して下さい。

◇ 血小板減少：血が出やすい、アザができる

血小板が減少すると血が止まりにくくなります。ケガや転倒には十分注意し、歯磨きや鼻をかむ時はやさしく行いましょう。

◇ 白血球減少：発熱、寒気、咳、のどの痛み、頭痛

白血球が減少すると体の抵抗力が弱まり、風邪や肺炎などの感染症にかかりやすくなります。
38℃以上の発熱がみられた場合はすぐに受診してください。
外出時はマスクを着用し、人ごみを避けましょう。
手洗い、うがいをこまめにしましょう。

◇ 貧血：めまい、息切れ、疲労

ヘモグロビンが減少すると、貧血症状（めまいなど）が起こりやすくなります。激しい運動は控え、疲れを感じたらこまめに休みましょう。

◇ 涙目

結膜炎や角膜炎が起こっている場合もありますので、目が痛い・かすむ、物が見えにくいなどの症状がある場合は主治医に相談して下さい。

文責：岐阜市民病院 薬剤部　TEL：058-251-1101