


# ジオトリフ®を服用する方へ

## 用法と服用上の注意点

- 1日1回**空腹時に**服用してください。  
服用前3時間～服用後1時間の間は食事を摂らないでください。
- 飲み忘れて、次の服用時間まで8時間以内の場合は、飲み忘れた薬剤は服用せずに、次に決められた時間に定められた服用量を服用してください。
- 毎日同じ時間に服用することで飲み忘れを防ぎましょう。
- セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)を含む食品は摂取しないでください。
- 下痢があるときは、水分摂取をこまめに行いましょう。また、牛乳や乳酸菌製剤(ヨーグルトなど)、刺激物、アルコールの摂取を控えてください。



## 主な副作用と発現時期

次のような症状があらわれたら、医療スタッフにお知らせください。  
※ 個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

服用当日～4週間	●下痢	●口内炎	●皮疹	●間質性肺炎
4週間～数か月	●皮膚乾燥	●爪周囲炎(爪囲炎)		

### ◇間質性肺炎

息切れ、空咳、発熱などの症状が現れた場合には、すぐに受診してください。

### ◇下痢

便の回数が増えたり下痢が起こりやすくなります。スポーツ飲料などで水分補給し、おなかを温かくして安静にしてください。

1日に4回以上の下痢回数の増加が48時間以上続く場合は受診してください。さらに、1日7回以上の下痢の増加がある場合はすぐに受診してください。

### ◇口内炎

口の中に発赤や潰瘍ができることがあります。痛みを伴う場合は早めに報告して下さい。アルコールを含むマウスウォッシュは使わないでください。

### ◇皮疹・皮膚乾燥

頭皮、手足などに赤いぶつぶつが現れたり、皮膚が乾燥することがあります。低刺激の保湿剤をこまめに塗ることで予防しましょう。(毎日1日2回以上) 発疹が現れた時は必ずスタッフに連絡してください。

### ◇爪周囲炎(爪囲炎)

爪の周りが腫れたり、爪が変形・変色したりします。爪の周りに保湿剤を塗ることで予防しましょう。爪囲炎が現れた時は、処置が必要な場合もありますので早めに報告してください。

### ◇肝機能障害

ASTやALTが上昇することがあります。疲れを感じる、尿の色が濃くなる、皮膚や白目が黄色くなるなどの症状が現れた場合は、すぐに連絡してください。

### ◇眼の異常

まれですが、眼の痛み、腫れ、発赤、かすみ目などの症状が現れる場合があります。