


パクリタキセル + アバスチン®療法を受けられる方へ

投与スケジュール



4週間を1コースとして繰り返します。

主な副作用と発現時期

次のような症状があらわれたら、医療スタッフにお知らせください。
※ 個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

当日(点滴中)

●血管痛・静脈炎 ●吐き気 ●過敏症

治療当日～数日

●関節痛・筋肉痛 ●吐き気 ●手足のしびれ

数日～数週間

●口内炎 ●下痢 ●白血球減少

数週間～数か月

●手足のしびれ ●貧血 ●脱毛 ●高血圧 ●出血

◇血管痛・静脈炎

点滴中および投与後に、点滴部位が痛んだり腫れてきた場合はすぐにお申し出ください。

◇過敏症：発疹、かゆみ、呼吸困難など

点滴中まれに、発疹、かゆみ、呼吸困難などのアレルギー症状が起こる場合があります。過敏症を抑える薬を事前に投与します。

どきどきする、発疹が出てかゆいなど普段と違うことがある場合はすぐにお申し出ください。

◇吐き気・食欲不振

水分を摂り、消化の良いものや食べたいものを少量ずつ食べましょう。

◇関節痛・筋肉痛

痛みのある部分を温めたり、体の中心へ向かってマッサージをしましょう。

◇末梢神経障害：手足のしびれなど

「しびれて歩きにくい」「細かな作業がしづらい」「感覚が鈍くなる」「手足の刺すような痛み」などの症状が現れることがあります。治療を続けるうちに悪化することがあるため、早めに報告してください。

◇白血球減少：発熱、寒気、のどの痛み、咳、頭痛

白血球が減少すると、抵抗力が低下して、感染症にかかりやすくなります。

38℃以上の発熱がみられた場合はすぐに受診してください。

外出時はマスクを着用し、人ごみを避けましょう。手洗い、うがいをこまめにしましょう。

◇脱毛

投与開始から数週間後に、髪の毛や体毛がほぼ抜けます。治療が終了すると、また生え始めます。シャンプーは刺激の少ないものを使用しましょう。

◇血圧の上昇：めまい、ふらつき

安静時の血圧が高くなり、激しい頭痛、めまい、吐き気、ふらつきが起こることがあります。

日頃から血圧を測定し、**最大血圧180mmHgまたは最少血圧120mmHgを超えた場合はご連絡ください。**

◇出血：血が止まりにくい、アザができる

鼻血、歯ぐき等からの出血が15分以上続く場合はすぐにご連絡ください。