


# キイトルーダ®による治療を受けられる方へ

## 投与スケジュール



3週間を1コースとして繰り返します。

## 主な副作用と発現時期

次のような症状があらわれたら、医療スタッフにお知らせください。  
※ 個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

点滴中～投与後24時間	●インフュージョンリアクション
治療期間中 (比較的早期に発現)	●皮膚障害 ●大腸炎 ●甲状腺機能障害 ●肝機能障害
治療期間中	●間質性肺炎 ●神経障害 ●1型糖尿病 ●重症筋無力症

### ◇インフュージョンリアクション

点滴中や投与後24時間以内に、発熱、悪寒、発疹、かゆみ、呼吸困難などの症状が起こる場合があります。動悸がする、発疹が出てかゆい、熱っぽさを感じるなどがあった場合はすぐにお知らせください。

### ◇間質性肺炎

息切れ、空咳、発熱などが現れたらすぐに受診してください。

### ◇重症筋無力症

手足に力が入らない、繰り返し運動で疲れる、ものが二重に見える、まぶたが重くなるなどの症状が出たら、受診してください。

### ◇大腸炎

大腸の粘膜が傷んで、下痢などが起こりやすくなります。持続する腹痛やひどい下痢が続いたり、血の混じった便が出たりする場合は受診してください。また、自己判断による下痢止めの使用は避けてください。

### ◇副腎機能障害

意識が薄れる、吐き気がする、体がだるい、食欲がない、むかむかするなどの症状が現れたら、受診してください。

### ◇肝機能障害

皮膚や白目が黄色い、体がだるいなどの症状が現れたら、受診してください。

### ◇甲状腺機能障害

いつもより疲れやすい、体重が急に増える・減る、いらいらしたり物忘れしたりしやすくなるなどの症状が現れたら、医療スタッフに連絡してください。

### ◇1型糖尿病

いつもよりのどが渇く、体重が減る、水分を多くとるようになるなどの症状が現れたら、受診してください。

### ◇静脈血栓塞栓症

息苦しい、皮膚や爪・唇が青紫色になる、足がむくむ、などの症状が現れたら、受診してください。水分をしっかりととり、長時間同じ姿勢はとらないようにしましょう。

### ◇皮膚障害

発疹、かゆみ、白斑が現れることがあります。まれに皮膚や粘膜など、全身に広がるような重度の皮膚症状が起こることがありますので、このような症状があったら、医療スタッフに連絡してください。

### ◇神経障害

足がしびれて歩きにくい、細かな作業がしづらい、感覚が鈍くなる、手足が刺すように痛いなどの症状が現れることがありますので、このような症状があったら、医療スタッフに連絡してください。