

がん種	レジメン名	投与方法	1クール
大腸がん	FOLFIRI	レボホリナート 200mg/㎡ イリノテカン 150mg/㎡ フルオロウラシル(bolus) 400mg/㎡ フルオロウラシル(ci) 2400mg/㎡ <day1> (2週1クール)	14
	FOLFIRI + ベバシズマブ	FOLFIRI + ベバシズマブ 5mg/kg <day1> (2週1クール)	14
	FOLFIRI + セツキシマブ	FOLFIRI + セツキシマブ 400mg/㎡ (初回) → 250mg/㎡ (2回目以降) (2週1クール: FOLFIRI day1、セツキシマブ day1.8)	14
	FOLFIRI + パニツムマブ	FOLFIRI + パニツムマブ 6mg/kg <day1> (2週1クール)	14
	FOLFIRI + ラムシルマブ	FOLFIRI + ラムシルマブ 8mg/kg <day1> (2週1クール)	14
	FOLFIRI + アフリベルセプト	FOLFIRI + アフリベルセプト 4mg/kg <day1> (2週1クール)	14
	mFOLFOX6	レボホリナート 200mg/㎡ オキサリプラチン 85mg/㎡ フルオロウラシル(bolus) 400mg/㎡ フルオロウラシル(ci) 2400mg/㎡ <day1> (2週1クール)	14
	mFOLFOX6 + ベバシズマブ	mFOLFOX6 + ベバシズマブ 5mg/kg <day1> (2週1クール)	14
	mFOLFOX6 + セツキシマブ	mFOLFOX6 + セツキシマブ 400mg/㎡ (初回) → 250mg/㎡ (2回目以降) (2週1クール: mFOLFOX day1、セツキシマブ day1.8)	14
	mFOLFOX6 + パニツムマブ	mFOLFOX6 + パニツムマブ 6mg/kg <day1> (2週1クール)	14
	FOLFOXIRI	レボホリナート 200mg/㎡ イリノテカン 150mg/㎡ オキサリプラチン 85mg/㎡ フルオロウラシル(ci) 2400mg/㎡ <day1> (2週1クール)	14
	FOLFOXIRI + ベバシズマブ	FOLFOXIRI + ベバシズマブ 5mg/kg <day1> (2週1クール)	14
	FOLFOXIRI + セツキシマブ	FOLFOXIRI + セツキシマブ 400mg/㎡ (初回) → 250mg/㎡ (2回目以降) (2週1クール: FOLFOXIRI day1、セツキシマブ day1.8)	14
	SOX	オキサリプラチン 130mg/㎡ <day1> S-1 80-120mg/day <day1-14> (3週1クール)	21
	SOX + ベバシズマブ	オキサリプラチン 130mg/㎡ <day1> ベバシズマブ 7.5mg/kg <day1> S-1 80-120mg/day <day1-14> (3週1クール)	21
	SOX + RT	オキサリプラチン 50mg/㎡ <day1,8,22,29> S-1 80-120mg/day <day1-5,8-12,22-26,29-33> 放射線治療 計25回 (6週1クール)	42
	CAPOX	オキサリプラチン 130mg/㎡ <day1> カベシタピン 2000mg/㎡/day <day1-14> (3週1クール)	21
	CAPOX + ベバシズマブ	オキサリプラチン 130mg/㎡ <day1> ベバシズマブ 7.5mg/kg <day1> カベシタピン 2000mg/㎡/day <day1-14> (3週1クール)	21
	セツキシマブ	セツキシマブ 400mg/㎡ (初回) → 250mg/㎡ (2回目以降) <day1> (1週1クール)	7
	エンコラフェニブ + セツキシマブ	セツキシマブ 400mg/㎡ (初回) → 250mg/㎡ (2回目以降) <day1,8,15,22> エンコラフェニブ 300mg/day <day1-28> (4週1クール)	28
	エンコラフェニブ + ビニメチニブ + セツキシマブ	セツキシマブ 400mg/㎡ (初回) → 250mg/㎡ (2回目以降) <day1,8,15,22> エンコラフェニブ 300mg/day ビニメチニブ 90mg/day <day1-28> (4週1クール)	28
	パニツムマブ	パニツムマブ 6mg/kg <day1> (2週1クール)	14
	CAPIRI	イリノテカン 200mg/㎡ <day1> カベシタピン 1600mg/㎡/day <day1-14> (3週1クール)	21
	CAPIRI + ベバシズマブ	イリノテカン 200mg/㎡ <day1> ベバシズマブ 7.5mg/kg <day1> カベシタピン 1600mg/㎡/day <day1-14> (3週1クール)	21
	IRIS	イリノテカン 125mg/㎡ <day1,15> S-1 80-120mg/day <day1-14> (4週1クール)	28
	IRIS + ベバシズマブ	イリノテカン 100mg/㎡ <day1,15> S-1 80-120mg/day <day1-14> ベバシズマブ 5mg/kg <day1,15> (4週1クール)	28
	OPT-11 + セツキシマブ	イリノテカン 150mg/㎡ <day1> セツキシマブ 400mg/㎡ (初回) → 250mg/㎡ (2回目以降) <day1.8> (2週1クール)	14
	OPT-11 + パニツムマブ	イリノテカン 150mg/㎡ <day1> パニツムマブ 6mg/kg <day1> (2週1クール)	14
	TAS-102 + ベバシズマブ	チピラシル トリフルリジン 70mg/㎡/day <day1-5,8-12> ベバシズマブ 5mg/kg <day1,15> (4週1クール)	28
	UFT + LV + ベバシズマブ	ウラシル テガフル 300mg/㎡/day <day1-21> ホリナート 75mg/day <day1-21> ベバシズマブ 5mg/kg <day1,15> (4週1クール)	28
ニボルマブ(2週)	ニボルマブ 240mg/body <day1> (2週1クール)	14	
ニボルマブ(4週)	ニボルマブ 480mg/body <day1> (4週1クール)	28	
イピリムマブ + ニボルマブ	イピリムマブ 1mg/kg ニボルマブ 240mg/body <day1> (3週1クール) ※ 4クール投与	21	
ベルツズマブ + トラスツズマブ	ベルツズマブ 840mg/body (初回) → 420mg/body (2回目以降) <day1> トラスツズマブ 8mg/kg (初回) → 6mg/kg (2回目以降) <day1> (3週1クール)	21	