

がん種	レジメン名	投与方法	1クール
膵がん	GEM	ゲムシタピン 1000mg/m <sup>2</sup> <day1,8,15> (4週1クール)	28
	GEM + S-1	ゲムシタピン 1000mg/m <sup>2</sup> <day1,15> S-1 80-120mg/day <day1-14> (4週1クール)	28
	術前GEM + S-1	ゲムシタピン 1000mg/m <sup>2</sup> <day1,8> S-1 80-120mg/day <day1-14> (3週1クール) ※ 2クール投与	21
	GEM + エルロチニブ	ゲムシタピン 1000mg/m <sup>2</sup> <day1,8,15> エルロチニブ 100mg/day <day1-28> (4週1クール)	28
	GEM + nab-PTX	ゲムシタピン 1000mg/m <sup>2</sup> <day1,8,15> アルブミン懸濁型パクリタキセル 125mg/m <sup>2</sup> <day1,8,15> (4週1クール)	28
	FOLFIRINOX	レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> イリノテカン 180mg/m <sup>2</sup> フルオロウラシル(bolus) 400mg/m <sup>2</sup> フルオロウラシル(ci) 2400mg/m <sup>2</sup> <day1> (2週1クール)	14
	リボソーム化イリノテカン + 5-FU/LV	ナリリボソーマル イリノテカン 70mg/m <sup>2</sup> レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> フルオロウラシル(ci) 2400mg/m <sup>2</sup> <day1> (2週1クール)	14
胆道がん	GEM	ゲムシタピン 1000mg/m <sup>2</sup> <day1,8,15> (4週1クール)	28
	GEM + S-1	ゲムシタピン 1000mg/m <sup>2</sup> <day1,15> S-1 80-120mg/day <day1-14> (4週1クール)	28
	GEM + CDDP	ゲムシタピン 1000mg/m <sup>2</sup> <day1,8> シスプラチン 25mg/m <sup>2</sup> <day1,8> (3週1クール)	21
	デュルバルマブ + GEM + CDDP	デュルバルマブ 1500mg/body <day1> ゲムシタピン 1000mg/m <sup>2</sup> <day1,8> シスプラチン 25mg/m <sup>2</sup> <day1,8> (3週1クール) ※ 最大8クール	21
	デュルバルマブ維持	デュルバルマブ 1500mg/body <day1> (4週1クール) ※ デュルバルマブ + GEM + CDDP施行後から開始	28
	GEM + CDDP + S-1	ゲムシタピン 1000mg/m <sup>2</sup> <day1> シスプラチン 25mg/m <sup>2</sup> <day1> S-1 80-120mg/day <day1-7> (2週1クール)	14
肝がん	アテゾリズマブ + ベバシズマブ	アテゾリズマブ 1200mg/body ベバシズマブ 15mg/kg <day1> (3週1クール)	21
	デュルバルマブ	デュルバルマブ 1500mg/body <day1> (4週1クール)	28
	トレメリムマブ + デュルバルマブ	トレメリムマブ 300mg/body デュルバルマブ 1500mg/body <day1> (4週1クール) ※ 1クール	28
	ラムシルマブ	ラムシルマブ 8mg/kg <day1> (2週1クール)	14