

| がん種 | レジメン名 | 投与方法 | 1クール |
|-----|----------------------------------|---|------|
| 乳がん | EC | エビルピシン 100mg/㎡ シクロホスファミド 600mg/㎡ <day1> (3週1クール) ※ 4クール投与 | 21 |
| | dose-dense EC | エビルピシン 100mg/㎡ シクロホスファミド 600mg/㎡ <day1> ベグフィルグラスチム 3.6mg <day2-4の間に1回> (2週1クール) ※ 4クール投与 | 14 |
| | weekly PTX (100mg/㎡) | EC療法(3週毎)4クール終了後 パクリタキセル 100mg/㎡ (1週1クール) | 7 |
| | weekly PTX(90) + ペバシズマブ | パクリタキセル 90mg/㎡ <day1,8,15> ペバシズマブ 10mg/kg <day1,15> (4週1クール) | 28 |
| | weekly PTX(80) + トラスツズマブ | パクリタキセル 80mg/㎡ <day1,8,15> トラスツズマブ 4mg/kg(初回) → 2mg/kg <day1,8,15,22> (4週1クール) | 28 |
| | dose-dense PTX | パクリタキセル 175mg/㎡ <day1> ベグフィルグラスチム 3.6mg <PTX投与終了後24時間後> (2週1クール) ※ 4クール投与 | 14 |
| | DOC + CPA | ドセタキセル 75mg/㎡ シクロホスファミド 600mg/㎡ <day1> (3週1クール) | 21 |
| | DOC | EC療法(3週毎)4クール終了後 ドセタキセル 75mg/㎡ <day1> (3週1クール) ※ 4クール投与 | 21 |
| | DOC + トラスツズマブ | ドセタキセル 75mg/㎡ トラスツズマブ 8mg/kg(初回) → 6mg/kg <day1> (3週1クール) | 21 |
| | 3w- トラスツズマブ | トラスツズマブ 8mg/kg(初回) → 6mg/kg <day1> (3週1クール) | 21 |
| | CMF | シクロホスファミド 600mg/㎡ メトレキサート 40mg/㎡ 5-FU 600mg/㎡ <day1> (3週1クール) | 21 |
| | 3w- nab-PTX | アルブミン懸濁型パクリタキセル 260mg/㎡ <day1> (3週1クール) | 21 |
| | エリブリン | エリブリン 1.4mg/㎡ <day1,8> (3週1クール) | 21 |
| | weekly CPT-11 | イリノテカン 100mg/㎡ <day1,8,15> (5週1クール) | 35 |
| | GEM | ゲムシタピン 1250mg/㎡ <day1,8> (3週1クール) | 21 |
| | VNR | ビノレルピン 25mg/㎡ <day1,8> (3週1クール) | 21 |
| | ベルツズマブ + トラスツズマブ + DOC | ベルツズマブ 840mg/body(初回) → 420mg/body トラスツズマブ 8mg/kg(初回) → 6mg/kg ドセタキセル 75mg/㎡ <day1> (3週1クール) | 21 |
| | ベルツズマブ + トラスツズマブ | ベルツズマブ 840mg/body(初回) → 420mg/body トラスツズマブ 8mg/kg(初回) → 6mg/kg <day1> (3週1クール) | 21 |
| | T-DM1 | トラスツズマブ エムタンシン 3.6mg/kg <day1> (3週1クール) | 21 |
| | トラスツズマブ デルクステカン | トラスツズマブ デルクステカン 5.4mg/kg <day1> (3週1クール) | 21 |
| | ベムプロリズマブ + CBDCA + GEM | ベムプロリズマブ 200mg/body <day1> カルボプラチン AUC=2 ゲムシタピン 1000mg/㎡ <day1,8> (3週1クール) | 21 |
| | ベムプロリズマブ(3週) + weekly PTX | ベムプロリズマブ 200mg/body <day1,22,43,64> パクリタキセル 90mg/㎡ <day1,8,15,29,36,43,57,64,71> (12週1クール) | 84 |
| | ベムプロリズマブ(6週) + weekly PTX | ベムプロリズマブ 400mg/body <day1,43> パクリタキセル 90mg/㎡ <day1,8,15,29,36,43,57,64,71> (12週1クール) | 84 |
| | ベムプロリズマブ + weekly nab-PTX | ベムプロリズマブ 200mg/body <day1,22,43,64> アルブミン懸濁型パクリタキセル 100mg/㎡ <day1,8,15,29,36,43,57,64,71> (12週1クール) | 84 |
| | 術前ベムプロリズマブ + CBDCA + weekly PTX | ベムプロリズマブ 200mg/body カルボプラチン AUC=5 <day1> パクリタキセル 80mg/㎡ <day1,8,15> (3週1クール) ※ 4クール投与 | 21 |
| | 術前ベムプロリズマブ + weekly(CBDCA + PTX) | ベムプロリズマブ 200mg/body <day1> カルボプラチン AUC=1.5 パクリタキセル 80mg/㎡ <day1,8,15> (3週1クール) ※ 4クール投与 | 21 |
| | 術前ベムプロリズマブ + EC | CBDCA + PTX併用療法後 ベムプロリズマブ 200mg/body エビルピシン 90mg/㎡ シクロホスファミド 600mg/㎡ <day1> (3週1クール) ※ 4クール投与 | 21 |
| | 術後ベムプロリズマブ(3週) | ベムプロリズマブ 200mg/body <day1> (3週1クール) ※ 9クール投与 | 21 |
| | 術後ベムプロリズマブ(6週) | ベムプロリズマブ 400mg/body <day1> (6週1クール) ※ 5クール投与 | 42 |
| | アテゾリズマブ + weekly nab-PTX | アテゾリズマブ 840mg/body <day1,15> アルブミン懸濁型パクリタキセル 100mg/㎡ <day1,8,15> (4週1クール) | 28 |