2017.4作成

サイラムザ®の治療を受けられる方へ

●サイラムザ®は結腸・直腸がんに用いられます。FOLFIRI療法と併用して使用します。

投与スケジュール



2週間を1コースとして繰り返します。

主な副作用

次のような症状が現れたら、医療スタッフにお知らせください。
※　個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

◇高血圧
放置すると血管や心臓などに負担をかけることになるので、降圧薬を飲んで血圧をきちんとコントロールすることが大切です。日々の血圧をチェックするために、家庭血圧計で血圧を測定するとよいでしょう。

◇下痢
下痢が続くと脱水症状となることがあるので、スポーツ飲料などで水分補給をするようにしましょう。激しい下痢や下痢が長く続く、排便回数が多い（1日4回以上）ときはご相談ください。

◇鼻血
ほとんどの場合は軽度で、安静にしていればいずれ止まります。出血がなかなか止まらない時は、ご相談ください。

◇頭痛
頭痛が起こった場合、医師に連絡してください。高血圧が原因になっている場合もありますので、血圧の測定をしてみましょう。

◇疲労
「だるい」「疲れやすい」「やる気が出ない」といった身体的・精神的な疲れが出ることがあります。治療中は、無理をせず、十分に休息をとることが大切です。

◇白血球・好中球減少：抵抗力の低下
白血球・好中球の数が減ると体の抵抗力が落ち、風邪などの感染症にかかりやすくなります。
38℃以上の発熱がみられた場合、すぐ受診してください。
外出時はマスクを着用し、人ごみを避けてください。
手洗い、うがいをこまめにしましょう。

◇脳梗塞
体の麻痺、ろれつが回らないなどの症状が現れたら、すぐ連絡してください。

◇心筋梗塞
強い胸の痛み、圧迫感などの症状が現れたら、すぐ連絡してください。

◇消化管出血
吐血、血便などの症状が現れたら、すぐ連絡してください。

◇消化管穿孔：腹痛
突然強い腹痛が起きた場合、すぐ連絡してください。

◇間質性肺炎
息切れ、空咳、発熱などの症状が現れた場合には、すぐに受診してください。

文責：岐阜市民病院薬剤部　TEL: 058-251-1101