


## カルセド®による治療を受けられる方へ

## 投与スケジュール



3～4週間を1コースとして繰り返します。

## 主な副作用と発現時期

次のような症状があらわれたら、医療スタッフにお知らせください。  
※ 個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

治療当日～数日	<ul style="list-style-type: none"> <li>●血管痛・静脈炎</li> <li>●吐き気・嘔吐</li> <li>●食欲不振</li> </ul>
治療数日～数週間	<ul style="list-style-type: none"> <li>●白血球減少</li> <li>●血小板減少</li> <li>●下痢</li> <li>●口内炎</li> </ul>
数週間～数か月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●脱毛</li> <li>●貧血</li> </ul>

◇**白血球減少**：発熱、寒気、咳、のどの痛み、頭痛  
38℃以上の発熱がみられた場合はすぐに受診してください。

外出時はマスクを着用し、人ごみを避けましょう。  
手洗い、うがいをこまめにしましょう。

◇**血小板減少**：血が出やすい、アザができる  
血が止まりにくくなるため、ケガや転倒、打撲には十分注意しましょう。また鼻かみや歯磨きは優しく行うようにしましょう。

◇**血管痛・静脈炎**  
点滴中および投与後に、注射部位が痛んだり腫れてきた場合はすぐにお申し出ください。

◇**吐き気・嘔吐、食欲不振**  
なるべく水分を摂るようにし、消化の良いものや食べたいものを少量ずつ食べるようにしましょう。

◇**口内炎**：口の中が痛い、しみる、味がおかしい  
うがいなどをして口の中を清潔に保つようにしてください。痛みを伴う場合は早めに報告してください。

◇**間質性肺炎**  
息切れ、空咳、発熱などの症状が現れた場合には、すぐに受診してください。

◇**心毒性**  
むくみや動悸が現れた場合はすぐに病院に連絡してください。

◇**脱毛**  
治療を何コースか繰り返す間に徐々に現れることがあります。カルセドによる治療が終了すれば、徐々に回復します。  
頭皮への刺激はなるべく避けましょう。容姿が気になる場合、あらかじめ帽子やかつらなどを用意しておくといでしょう。

◇**下痢**  
1日に何度も下痢が続く場合は、受診してください。  
スポーツ飲料などで水分をこまめに補給し、温かくして安静に過ごしましょう。