


TC療法を受けられる方へ

TC療法とは、タキソテール®とエンドキサン®の2剤を組み合わせた乳癌に対する治療法です。

投与スケジュール

1日目	2日目以降
タキソテール®	休薬期間
エンドキサン®	

 点滴

← 1コース(3週間) →

3週間を1コースとして通常4コース繰り返します。

主な副作用と発現時期

次のような症状があらわれたら、医療スタッフにお知らせください。
※ 個人差があるので、その他の副作用についても十分注意して下さい。

治療当日	●アレルギー ●血管痛・静脈炎
治療当日～数日	●吐き気・嘔吐 ●食欲不振
数日～数週間	●骨髄抑制※ ●筋肉・関節の痛み ●疲労感(倦怠感) ●味覚の変化 ●脱毛 ●下痢 ●口内炎 ●発疹・皮膚炎
数週間～数カ月	●浮腫(むくみ) ●しびれ ●爪の変化 ●涙目

※ 骨髄抑制：白血球減少、貧血、血小板減少

◇アレルギー

息苦しい、胸が苦しい、体がかゆい、顔がほてる、汗が出る場合はすぐに申し出てください。また、アルコールに過敏な方やアルコール不耐症の方は治療を受ける前にお知らせください。

◇血管痛・静脈炎

点滴中および投与後に、注射部位が腫れたり、痛みや灼熱感を感じた場合は、すぐにスタッフにお知らせください。

◇吐き気、嘔吐、食欲不振

なるべく水分を摂るようにし、消化の良いものや食べたいものを少量ずつ食べるようにしましょう。

◇口内炎：口の中が痛い、しみる

うがいなどをして口の中を清潔に保つようにしてください。

◇脱毛

シャンプーは刺激の少ないものを使用したり、ブラッシングの回数を減らして髪に刺激をあたえないようにしましょう。

◇下痢

下痢と発熱が同時に起こった場合やひどい下痢が続く場合はすぐに受診してください。

脱水症状になるのを防ぐため、スポーツドリンクなどで水分を十分に補給しましょう。

◇白血球減少：発熱、寒気、咳、のどの痛み、頭痛

38℃以上の発熱がみられた場合はすぐに受診してください。

外出時はマスクを着用し、人混みを避けましょう。手洗い、うがいをこまめにしましょう。

◇しびれ

手や足の指がしびれたり、感覚が鈍くなったりすることがあります。転ばないように注意し、熱いものや刃物などの危険なものを取り扱うときにはけがをしないように十分注意しましょう。

◇浮腫(むくみ)

塩分や水分のとりすぎに気をつけましょう。定期的に体重を測定しましょう。