
上眼瞼皮膚弛緩症の手術 ～ 余分なまぶたの皮膚を切除し、すっきりとした目元に ～

手術前（上眼瞼皮膚弛緩症）



加齢などにより
上まぶたの皮膚が
ゆるみ、
まぶたの重さや
視野の妨げになる
ことがあります。

1 デザイン（切開線のマーキング）




まぶたのシワに沿って、
余分な皮膚を切除する範囲をマーキングします。

2 皮膚の切開



マーキングに沿って、
余分な皮膚を切開します。

3 余分な皮膚の切除



切開した部分の余分な皮膚を
丁寧に切除します。

4 縫合



皮膚を丁寧に縫合します。

5 術後（直後）



術直後は、腫れや内出血が
みられることがありますが、
徐々に落ち着いていきます。

手術後（数週間後のイメージ）



余分な皮膚が除去され、
すっきりとした目元になります。

! 手術のポイント

- 切開線はまぶたのシワに沿うため、傷跡が目立ちにくくなります。
- 個人差はありますが、手術時間は約30分～1時間程度です。
- 術後は、腫れや内出血が数日～1週間程度続くことがあります。

上眼瞼皮膚弛緩症　眉毛下切開手術

上まぶたの皮膚がたるんで視野が狭くなる、または見た目の重さが気になる場合に、
眉毛のすぐ下を切開してたるんだ皮膚を切除する手術です。

1 術前の状態




上まぶたの皮膚がたるみ、
まつ毛が隠れてしまっています。

2 切開線のデザイン




眉毛のすぐ下に、たるみの程度に
合わせて切開線をデザインします。

3 皮膚の切除



切開した部分から、たるんだ皮膚を
慎重に切除します。

4 縫合



皮膚を丁寧に縫合します。
切開線は眉毛のすぐ下にあるため、
目立ちにくくなります。

5 術後の状態



たるみが改善し、すっきりとした
目元になります。

術前



術後

